

TYMLOS[®]
(abaloparatide) injection
30-day prefilled pen | 80 mcg daily

担心因骨质疏松而造成您的骨量流失？

Add To The Bone

TYMLOS 通过重建骨骼，助您抵御骨质疏松。



非实际患者

适应症

TYMLOS 是什么？

TYMLOS 是一种处方药，用于：

- 治疗绝经后骨折高风险女性的骨质疏松症，或适用于不能使用其他骨质疏松症治疗，或其他骨质疏松症治疗效果不佳的患者。TYMLOS 可降低因骨质疏松导致骨骼脆弱的绝经后女性发生脊柱和其他部位骨折的风险。
- 提高患有骨质疏松症且骨折风险较高、不能使用其他骨质疏松症治疗或其他骨质疏松症治疗效果不佳的男性患者的骨密度。


对于 18 岁及以下儿童和青年，TYMLOS 是否安全有效仍然未知。TYMLOS 不应该用于骨骼仍在生长的儿童和青少年。

请阅读第 14–15 页的重要安全须知。

如需了解更多信息，请访问 [TYMLOS.com](https://www.tymlos.com)

骨质疏松正在悄然侵蚀您的骨量！

我们的骨骼始终处于修复循环之中，在这个过程中不断清除受损骨骼，并生成新的骨骼。当清除的骨量超过新生骨量时，就会出现骨质疏松，导致骨量流失并增加骨折风险。



骨质疏松症有两种治疗方法：



减缓骨清除

一种治疗能够减缓现有骨骼的流失。这有利于减缓骨质疏松症的发病率，但无法促进新骨生成。



重建骨骼

另一类治疗包括 TYMLOS, 它通过重建骨骼来帮助提升您的骨密度。

骨质疏松症无法治愈，因此您应与医生密切合作，寻找合适的药物和生活方式，以帮助预防进一步的骨量流失或维持现有的骨密度。

TYMLOS[®]

(abaloparatide) injection

30-day prefilled pen | 80 mcg daily



非实际患者

如果您能重建失去的骨骼， 这对您意味着什么？

重要安全信息精选

关于 TYMLOS，我应该了解的最重要信息是什么？

TYMLOS 可能导致严重的副作用，包括：

可能引起骨癌（骨源性肉瘤）。在动物药物测试中，TYMLOS 引起某些大鼠产生称为骨源性肉瘤的骨癌。目前尚不知道 TYMLOS 使用者是否发生骨源性肉瘤的机率更高。

- 如果您出现骨痛，身体任何部位有持续不消的疼痛，或在皮下发现新的或异常的肿块、肿胀并伴有压痛，请立即告知您的医务人员。

TYMLOS 可在治疗期间 通过重建骨骼来改变 骨质疏松症的病程。

TYMLOS 是经 FDA 批准用于适用女性和男性的治疗。每日使用注射笔注射 TYMLOS，通过激活身体的自然骨重建过程来重建骨骼。

在女性和男性的临床研究中，与安慰剂相比，TYMLOS 显示出骨密度 (BMD) 的显著提升。

TYMLOS 是经验证的治疗方案，适用于以下患者：




尝试过其他骨质疏松症治疗但未成功。

或



面临高骨折风险。

或



已经发生过骨折。

重要安全信息精选 (续)

关于 TYMLOS，我应该了解的最重要信息是什么？

请勿使用 TYMLOS：

- 如果您对 abaloparatide 或 TYMLOS 中的其他任何成分过敏。TYMLOS 的非活性成分包括苯酚、醋酸钠三水合物、乙酸和注射用水。

TYMLOS[®]


(abaloparatide) injection

30-day prefilled pen | 80 mcg daily




非实际患者

没有证据表明 TYMLOS
对骨密度 (BMD) 的作用在
不同人群间存在差异：




对于女性, 在 18 个月的治疗中,
**已证明 TYMLOS 相比安慰剂
可在增加 BMD 的同时显著
降低骨折风险。**

降低脊柱骨折风险高达。



使用 TYMLOS 的女性脊柱骨折率为 0.6%, 而安慰剂组为 4.2%。

降低非脊柱骨折
风险高达。




使用 TYMLOS 的女性非脊柱骨折率为 2.7%, 而安慰剂组为 4.7%。

TYMLOS 与安慰剂相比, 从研究开始到结束的 BMD 平均变化:



脊柱:

9.2% 对比 0.5%



髌骨:

3.4% 对比 -0.1%



股骨颈:

2.9% 对比 -0.4%

一项纳入 2460 多名绝经后女性的国际临床研究通过降低绝经后女性的骨折风险, 评估了 TYMLOS 在治疗骨质疏松症方面的安全性与有效性。将接受 TYMLOS 治疗与接受安慰剂 (一种不含任何药物的注射剂) 治疗 18 个月的女性进行比较。

TYMLOS[®]

(abaloparatide) injection

30-day prefilled pen | 80 mcg daily



非实际患者

TYMLOS 拥有确定的安全性特征。

TYMLOS 的安全性特征已在临床试验中得到验证，并在绝经后女性与男性中表现相似。

ACTIVE 试验中女性最常见的不良反应：

最常见的副作用*	TYMLOS (n=822)	安慰剂 (n=820)
尿钙水平升高	11%	9%
头晕	10%	6%
恶心	8%	3%
头痛	8%	6%
心跳加快	5%	0.4%
感觉疲倦(疲乏)	3%	2%
胃上部疼痛	3%	2%
旋转感(眩晕)	2%	2%
血钙水平升高	3%	0.1%


*≥2% 接受 TYMLOS 治疗的患者报告出现的不良反应。

对于男性, 治疗 12 个月后 与安慰剂相比, TYMLOS 可增加 脊柱、髌骨和股骨颈部的 BMD。

TYMLOS 与安慰剂相比, 从研究开始到结束 (12 个月) 的 BMD 平均变化:



脊柱:
8.5% 对比 1.2%



髌骨:
2.1% 对比 <0.1%



股骨颈:
3.0% 对比 0.2%

男性接受 TYMLOS 治疗 3 个月后, 与安慰剂相比, 脊柱、髌骨和股骨颈部的 BMD 均有所增加。

与安慰剂相比, TYMLOS 治疗 3 个月时的 BMD 平均变化:

- 脊柱: 3.8% 对比 1.1%
- 髌骨: 1.1% 对比 0.2%
- 股骨颈: 1.4% 对比 0.2%


一项纳入 228 多名男性的国际临床研究评估了 TYMLOS 在男性骨质疏松症患者中增加 BMD 的安全性及有效性。将接受 TYMLOS 治疗与接受安慰剂 (一种不含任何药物的注射剂) 治疗 12 个月的男性进行比较。

在 [TYMLOS.com](https://www.tymlos.com) 上进一步了解 TYMLOS。

TYMLOS[®]

(abaloparatide) injection

30-day prefilled pen | 80 mcg daily



非实际患者

TYMLOS 拥有确定的安全性特征。

TYMLOS 的安全性特征已在临床试验中得到验证，并在绝经后女性与男性中表现相似。

ATOM 试验中男性最常见的不良反应

最常见的副作用*	TYMLOS (n=149)	安慰剂 (n=79)
注射部位发红	13%	5%
头晕	9%	1%
关节疼痛	7%	1%
注射部位肿胀	7%	0%
注射部位疼痛	6%	0%
瘀伤	3%	0%
腹胀	3%	0%
腹泻	3%	0%
恶心	3%	0%
腹痛	2%	0%
骨痛	2%	0%
血钙水平升高	3%	0%

*≥2% 接受 TYMLOS 治疗的患者报告出现的不良反应。

皮下注射即可改变 骨质疏松症的病程

TYMLOS 可通过注射笔每日使用，您可以在家中或任意方便的地点进行。**该注射为皮下注射，即注射层较浅，不会进入肌肉。**

TYMLOS 注射笔经过精心设计，便于您随时随地使用。





TYMLOS[®]

(abaloparatide) injection

30-day prefilled pen | 80 mcg daily

非实际患者

重要安全信息精选 (续)

关于 TYMLOS, 我应该了解的最重要信息是什么?

在使用 TYMLOS 前, 请告知医务人员您的完整医疗状况, 包括您是否:

- 患有佩吉特骨病或其他骨病。
- 现有或既往有以下情况: 骨癌; 涉及骨骼的放射治疗; 血钙过高; 或甲状旁腺激素升高 (甲状旁腺功能亢进)。
- 难以自行使用 TYMLOS 注射笔, 且无人可协助您。

提供全方位支持, 助您顺利 开启并坚持 TYMLOS 治疗。

我们为您提供多种工具和资源, 帮助您轻松使用 TYMLOS, 并在管理骨质疏松症时保持治疗顺利进行。



TYMLOS 的作用机制教育



一对一注射培训



保险承保支持



共付额卡计划



专科药房使用指导



持续治疗支持

TYMLOS[®]

(abaloparatide) injection


30-day prefilled pen | 80 mcg daily



非实际患者

在使用 TYMLOS 期间，您将获得专属临床教育者的支持。他们会从一对一注射培训开始，并在整个治疗过程中为您提供支持。

在保险承保咨询、寻找专科药房、了解潜在节省方案时，Radius 支持团队将为您提供帮助。



**立即注册，获取
一对一患者支持！**

立即扫码！



<https://bit.ly/TYMLOS-mandarin-digital>

重要安全信息精选 (续)

关于 TYMLOS，我应该了解的最重要信息是什么？

在使用 TYMLOS 前，请告知医务人员您的完整医疗状况，包括您是否 (续)：

- 怀孕或计划怀孕 (TYMLOS 不适用于孕妇)，或正在哺乳或计划哺乳。目前尚不清楚 TYMLOS 是否进入母乳；您不应在使用 TYMLOS 的同时哺乳。

请告诉医务人员您正在使用的所有药物，包括处方药、非处方药、维生素和草药补充剂。

适应症

什么是 TYMLOS (abaloparatide) ?

TYMLOS 是一种处方药, 用于:

- 治疗绝经后骨折高风险女性的骨质疏松症, 或适用于不能使用其他骨质疏松症治疗, 或其他骨质疏松症治疗效果不佳的患者。TYMLOS 可降低因骨质疏松导致骨骼脆弱的绝经后女性发生脊柱和其他部位骨折的风险。
- 提高患有骨质疏松症且骨折风险较高、不能使用其他骨质疏松症治疗或其他骨质疏松症治疗效果不佳的男性患者的骨密度。

对于 18 岁及以下儿童和青年, TYMLOS 是否安全有效仍然未知。TYMLOS 不应该用于骨骼仍在生长的儿童和青少年。

重要安全性信息

关于 TYMLOS, 我应该了解的最重要信息是什么?

TYMLOS 可能导致严重的副作用, 包括:

可能引起骨癌 (骨原性肉瘤)。在动物药物测试中, TYMLOS 引起某些大鼠产生称为骨原性肉瘤的骨癌。目前尚不知道 TYMLOS 使用者是否发生骨原性肉瘤的机率更高。

- 如果您出现骨痛, 身体任何部位有持续不消的疼痛, 或在皮下发现新的或异常的肿块、肿胀并伴有压痛, 请立即告知您的医务人员。

请勿使用 TYMLOS:

- 如果您对 abaloparatide 或 TYMLOS 中的其他任何成分过敏。TYMLOS 的非活性成分包括苯酚、醋酸钠三水合物、乙酸和注射用水。

在使用 TYMLOS 前, 请告知医务人员您的完整医疗状况, 包括您是否:

- 患有佩吉特骨病或其他骨病。
- 现有或既往有以下情况: 骨癌; 涉及骨骼的放射治疗; 血钙过高; 或甲状旁腺激素升高 (甲状旁腺功能亢进)。
- 难以自行使用 TYMLOS 注射笔, 且无人可协助您。
- 怀孕或计划怀孕 (TYMLOS 不适用于孕妇), 或正在哺乳或计划哺乳。目前尚不清楚 TYMLOS 是否进入母乳; 您不应在使用 TYMLOS 的同时哺乳。

请告诉医务人员您正在使用的所有药物, 包括处方药、非处方药、维生素和草药补充剂。

TYMLOS 可能会有哪些副作用？

TYMLOS 可能导致严重副作用，包括：

- **体位性低血压。**在注射 TYMLOS 后，有些人可能会感到头晕、心跳加快或眩晕。这些症状通常会在数小时内消失。如出现上述症状，请在可立即坐下或躺下的地方注射 TYMLOS。若症状加重或持续，请停用 TYMLOS，并打电话联系医务人员。
- **血钙升高（高钙血症）。**TYMLOS 可导致部分患者血钙水平高于正常值。在开始和治疗期间，医务人员可能会检测您的血钙。如有恶心、呕吐、便秘、乏力或肌无力，请告知医务人员。这些可能是血钙过高的表现。
- **尿钙升高（高钙尿症）。**TYMLOS 可导致部分患者尿钙水平升高。钙水平升高可能导致肾脏、膀胱或尿道形成肾结石（尿路结石）。如有腰部或下腹疼痛、排尿疼痛或血尿等肾结石症状，请立即告知医务人员。

TYMLOS 在绝经后骨质疏松女性中最常见的不良反应包括：

- 头晕、恶心、头痛、心跳加快、乏力、上腹痛及眩晕感。

TYMLOS 在男性骨质疏松患者中最常见的不良反应包括：

- 注射部位发红、头晕、关节痛、注射部位肿胀、注射部位疼痛、淤青、腹胀、腹泻、恶心、肚子痛和骨头痛。

这些并非 TYMLOS 的所有潜在副作用。如需医疗建议，请打电话联系您的医生。您可致电 1-800-FDA-1088 向美国食品药品监督管理局 (FDA) 报告副作用。

我应该如何使用 TYMLOS？

- 请阅读随药附带的完整**使用说明**。
- 如您使用的 TYMLOS 超过处方剂量，可能出现肌肉无力、乏力、头痛、恶心、头晕（尤其在久坐后起身时）及心跳加快等症状。此时应停用 TYMLOS，并立即致电您的医务人员。
- 您一生中使用 TYMLOS 的累计时间不得超过 2 年。

请阅读[完整的处方信息](#)，[包括用药指南](#)。

TYMLOS[®]
(abaloparatide) injection
30-day prefilled pen | 80 mcg daily

临床 教育工作者 网络

对患者的一对一帮助

**专属临床教育工作者正等待
您的来电！**

只有 TYMLOS 为您提供专属的临床教育工作者。我们的临床教育工作者将在您的治疗期间为您提供一对一注射培训，持续支持，并解答您关于使用 TYMLOS 的问题。

**立即注册，与我们的临床教育工作者一对一交流
TYMLOS。**

您可在美国东部时间周一至周五上午
8 点至下午 7 点致电 1-855-730-8591
联系临床教育工作者。

立即扫码！



<https://bit.ly/TYMLOS-mandarin-digital>

请阅读第 14–15 页的重要安全须知和完整的处方信息，包括
[用药指南](#)。

RADIUS[®]

TYMLOS 和 Radius 是 Radius Health, Inc. 的注册商标。

© 2025 Radius Health, Inc. 保留所有权利。11/25 TYM-US-06794